

# Endomorphisme et division euclidienne

## Introduction

Dans ce problème, on se donne un entier  $n \in \mathbb{N}^*$  et un couple  $(A, B) \in \mathbb{C}_n[X] \times \mathbb{C}[X]$  tel que  $\deg(B) = n+1$ . On considère également l'application  $\varphi$  définie sur  $\mathbb{C}_n[X]$  qui à un polynôme  $P \in \mathbb{C}_n[X]$  associe le reste dans la division euclidienne de  $AP$  par  $B$ .

Par exemple, si on suppose que l'on a

$$n = 2, \quad A = X^2, \quad B = X^3 - X, \quad P = X^2 + X + 1,$$

alors, en effectuant la division euclidienne de  $AP$  par  $B$ , on obtient

$$AP = X^4 + X^3 + X^2 = BQ + R \quad \text{avec} \quad Q = X + 1 \quad \text{et} \quad R = 2X^2 + X,$$

donc on a  $\varphi(P) = 2X^2 + X$ .

L'objectif de ce problème est de montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme d'étudier sa diagonalisabilité dans différents cas.

## I. Généralités sur l'application $\varphi$

Dans cette partie, on démontre que l'application  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{C}_n[X]$ .

1. Justifier que pour tout polynôme  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ , on a  $\varphi(P) \in \mathbb{C}_n[X]$ .
2. On considère un scalaire  $\lambda \in \mathbb{C}$  et un couple de polynômes  $(P_1, P_2) \in \mathbb{C}_n[X]^2$ . Par le théorème de la division euclidienne, il existe  $(Q_1, R_1) \in \mathbb{C}[X] \times \mathbb{C}_n[X]$  et  $(Q_2, R_2) \in \mathbb{C}[X] \times \mathbb{C}_n[X]$  tels que

$$AP_1 = BQ_1 + R_1 \quad \text{et} \quad AP_2 = BQ_2 + R_2.$$

Exprimer le quotient et le reste dans la division euclidienne de  $A(P_1 + \lambda P_2)$  par  $B$  en fonction de  $\lambda$  et des polynômes  $Q_1, Q_2, R_1$  et  $R_2$  en justifiant votre réponse. En déduire que  $\varphi$  est un endomorphisme de l'espace vectoriel  $\mathbb{C}_n[X]$ .

## II. Étude d'un premier exemple

Dans cette partie uniquement, on suppose que

$$n = 2, \quad A = X^2 + 2X \quad \text{et} \quad B = X^3 + X^2 - X - 1.$$

1. Montrer que la matrice de l'endomorphisme  $\varphi$  de  $\mathbb{C}_2[X]$  dans la base  $(1, X, X^2)$  est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}).$$

2. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de la matrice  $M$ .
3. Justifier que l'endomorphisme  $\varphi$  est diagonalisable. Déterminer une base de  $\mathbb{C}_2[X]$  formée de vecteurs propres de  $\varphi$ .

### III. Étude d'un second exemple

Dans cette partie uniquement, on suppose que  $n = 2$  et que  $B = X^3$ . Comme  $A$  est un élément de l'espace vectoriel  $\mathbb{C}_2[X]$ , il existe  $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3$  tel que  $A = \alpha + \beta X + \gamma X^2$ .

1. Montrer que la matrice de l'endomorphisme  $\varphi$  de  $\mathbb{C}_2[X]$  dans la base  $(1, X, X^2)$  est

$$T = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ \gamma & \beta & \alpha \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}).$$

2. Montrer que l'endomorphisme  $\varphi$  est diagonalisable si et seulement si le polynôme  $A$  est constant.

### IV. Étude du cas où $B$ est scindé à racines simples

Dans cette partie, on suppose que  $B$  est un polynôme scindé à racines simples. On note  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{C}$  les racines de  $B$  qui sont donc des nombres complexes distincts.

1. On définit les polynômes de Lagrange  $L_0, \dots, L_n \in \mathbb{C}_n[X]$  associés aux points  $x_0, \dots, x_n$  par

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad L_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - x_i}{x_k - x_i}.$$

- a) Soit  $(k, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$ . Calculer  $L_k(x_j)$  en distinguant les cas  $k = j$  et  $k \neq j$ .
  - b) Soit  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ . Montrer que  $x_0, \dots, x_n$  sont des racines du polynôme  $D = P - \sum_{i=0}^n P(x_i)L_i$ .
  - c) Dédire de la question précédente que pour tout  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ , on a  $P = \sum_{i=0}^n P(x_i)L_i$ .
  - d) Montrer que  $(L_0, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathbb{C}_n[X]$ .
2. Pour tout entier  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , on désigne respectivement par  $Q_k \in \mathbb{C}[X]$  et  $R_k \in \mathbb{C}_n[X]$  le quotient et le reste dans la division euclidienne de  $AL_k$  par  $B$ .
    - a) Soit  $(j, k) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$ . Montrer que  $R_k(x_j) = 0$  si  $j \neq k$  et que  $R_k(x_k) = A(x_k)$ .
    - b) En utilisant la question IV.1.c, en déduire pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  que  $\varphi(L_k) = A(x_k)L_k$ .
    - c) Justifier que l'endomorphisme  $\varphi$  est diagonalisable et préciser ses valeurs propres.

**Fin**